

2023 年园林绿化行业职工技能大赛题库（公布）

（300 题）单选 200、多选 30、判断 50、填空 20

一、单项选择题

1. 种子萌发的标志是（ D ）
A. 萌动 B. 吸胀 C. 发芽 D. 胚根突破种皮
2. 春化作用的主导因素是（ B ）
A. 高温 B. 低温 C. 光照 D. 水分
3. 长日照植物在长日照条件下开花受到促进，因而每天光照越长，则（ B ）
A. 每天开花的时间越早 B. 开花期越提前
C. 开花数量愈大 D. 开花时间愈长
4. 植物感受光周期的部位是（ C ）
A. 根尖 B. 茎尖 C. 叶片 D. 花
5. 被称为是肥料三要素的是（ B ）
A. 钙、镁、硫 B. 氮、磷、钾
C. 铁、锰、锌 D. 碳、氢、氧
6. 植物缺素进行形态诊断时，应该先看（ C ）
A. 看叶片的大小 B. 看叶片的失绿部位
C. 看症状出现的部位 D. 看叶片的形状
7. 光合作用与呼吸作用的关系是（ C ）
A. 对立 B. 统一
C. 既对立又统一 D. 没有关系
8. 下列园林植物中属攀援茎的是（ C ）
A. 黄金叶 B. 吊兰 C. 炮仗花 D. 黄金香柳
9. 树木定植后浇定根水的主要目的是？（ A ）
A. 使土壤充分沉降，与根系贴合

- B. 使土壤充分沉降，降低土壤中的空气含量
C. 使树木能及时发出新根
D. 能扶正树木
10. 大树移植的操作，哪项不正确？（ D ）
A. 踩实土壤 B. 扶正树木 C. 支撑树体 D. 每天浇水
11. 在建筑物的背面应该种什么植物？（ B ）
A. 阳性树种 B. 耐阴的植物 C. 一二年生植物 D. 水生植物
12. 二年生花卉在开花前需要经过？（ A ）
A. 低温春化 B. 高温休眠 C. 修剪 D. 干旱
13. 以下哪种植物是灌木（ C ）
A. 白兰 B. 樱花 C. 红背桂 D. 萍婆
14. 园林绿地是建立在城市中的一个（ ），渗透各行各业，各个领域；
（ A ）
A. 绿色生态系统 B. 附属单位 C. 个体空间 D. 生态链条
15. 紫薇的花期是（ C ）
A. 春季 B. 冬季 C. 夏季 D. 秋季
16. 银杏按观赏部位分类，属于（ B ）
A. 观花类 B. 观叶类 C. 观果类 D. 观芽类
17. 以下哪种植物是先开花后展叶（ C ）
A. 石榴 B. 榕树 C. 桃花 D. 桂花
18. 根据生态习性，荷花属于（ ）花卉（ A ）
A. 水生植物 B. 草本植物 C. 沉水植物 D. 多年生植物
19. 皇家园林规模宏伟，富丽堂皇，不乏严谨庄重的皇家风范，下面属于皇家园林的是（ A ）
A. 北京圆明园 B. 苏州狮子林 C. 东莞可园 D. 玉林谢鲁山庄
20. 霜霉菌侵染紫薇叶背时在病部出现一层（ C ）
A. 黄色粉状物 B. 灰色霉层 C. 白色霜状物 D. 白色粉状物
21. 树木施肥的范围应主要集中在树冠投影近外缘_处；（ C ）
A. 1/2 B. 1/3 C. 2/3 D. 3/4

22. 按照施肥的目的和时期可分为__;(D)
- A. 穴施、条施、环施 B. 追肥、撒施、沟施
C. 全面施、部施肥 D. 基肥、追肥、根外施肥
23. 为了提高大树移栽时的成活率,在移栽时最重要的是保证树体什么的平衡;(B)
- A. 新陈代谢 B. 水分代谢 C. 生态 D. 酸碱
24. 蛴螬主要危害草坪草的根部,主要取食()使它萎蔫枯死,造成缺苗断垄现象;(B)
- A. 成熟根茎 B. 幼嫩根茎 C. 幼嫩叶片 D. 成熟叶片
25. 当草坪缺水时草的颜色变成蓝绿色或灰绿色,叶色;(C)
- A. 由暗变亮,无光泽 B. 由亮变暗,有光泽
C. 由亮变暗,无光泽 D. 本化
26. 给草坪合理施肥有保持草坪致密、均匀、浓绿的效果,如()可使草坪尤其使叶片增绿;(A)
- A. 氮肥 B. 磷肥 C. 钾肥 D. 人畜粪肥
27. 部分遮阴和损害较严重的草坪的留茬高度应(A);
- A. 适当高一些 B. 适当低一些 C. 草种类定基本无变化
28. 以下哪类杀虫剂对蛴螬和蝼蛄等地下害虫有较好的防治效果;(B)
- A. 阿维菌素 B. 辛硫磷 C. 乐果 D. 氯氰菊酯
29. 斜纹夜蛾属鳞翅目夜蛾科,为害阶段主要是(C)
- A. 成虫 B. 蛹 C. 幼虫 D. 卵
30. 新植灌木有主干的灌木或小乔木修剪时主干上选留的主枝应短截(),其余疏掉;(A)
- A. 二分之一 B. 三分之一 C. 四分之一 D. 五分之一
31. 新植灌木无主干的灌木应从地下生出的枝条选 4-5 个生长正常的丛生枝短截(),并剪成圆头形;(A)
- A. 二分之一 B. 三分之一 C. 四分之一 D. 五分之一

32. 菟丝子没有叶绿素是种子植物，一般寄生在植物的（ A ）；
A. 全寄生，地上部 B. 半寄生，地下部
C. 全寄生，地下部 D. 半寄生，地上部
33. 对于园林害虫的防治灯光诱杀法属于（ ）的范畴；（ C ）
A. 农业防治 B. 化学防治
C. 物理防治 D. 生物防治
34. 下列园林树木中，有大量花着生于茎干上的是（ B ）；
A. 紫藤 B. 紫荆 C. 紫薇 D. 凌霄花
35. 昆虫纲中最大的一个目是（ C ）；
A. 鳞翅目 B. 半翅目 C. 鞘翅目 D. 直翅目
36. 花上出现缺刻、孔洞，这种害虫的口器具（ B ）；
A. 刺吸式 B. 咀嚼式 C. 虹吸式 D. 锉吸式
37. 不属于园林植物病害的是（ C ）
A. 杨树烂皮病 B. 丁香白粉病 C. 郁金香碎色病 D. 丁香花叶锅
38. 真菌的营养方式是（ B ）；
A. 自养型 B. 异养型 C. 好氧型 D. 咀嚼式
39. 真菌的繁殖方式为（ D ）；
A. 裂殖 B. 复制 C. 二均分裂 D. 无性和有性
40. 植物病毒的主要传播媒介（ C ）
A. 雨水 B. 空气 C. 昆虫 D. 鸟类
41. 用 70%的甲基托布津可湿性粉剂 30g 加水稀释成 1000 倍液防治灰霉病，应加水（ A ）kg
A. 30 B. 21 C. 3000 D. 2100
42. 配制 1%石灰倍量式波尔多液，硫酸铜、生石灰、水的比例为（ A ）
A. 1 : 2 : 100 B. 2 : 1 : 100 C. 1 : 0.5 : 100 D. 0.5 : 1 : 100
43. 下列农药剂型中，（ ）不能用于喷雾；（ A ）
A. 颗粒剂 B. 乳油 C. 水剂 D. 可湿性粉剂
44. 及时清除田园内残株落叶或立即翻耕，可消灭大量（ ）的传播

和扩展 (C)

A. 虫源 B. 幼虫 C. 虫卵 D. 成虫

45. 利用害虫的 () 性, 在其所喜欢的食物中掺入适量的毒剂来诱杀害虫; (C)

A. 趋光 B. 趋湿 C. 趋化 D. 趋色

46. 下面哪一种是吸汁类害虫 (B)

A 金龟子 B 叶蝉 C 叶峰 D 蝗虫

47. 以下抗冻力最差的是 (A)

A. 顶花芽 B. 腋花芽 C. 顶叶芽 D. 枝

48. 按树木的配置类型分类, 10 株以上乔灌木组成的树木群体称为 (C)

A. 对植 B. 列植 C. 群植 D. 丛植

49. 以下属于地被植物的是 (C)

A. 叶子花 B. 红花檵木 C. 鸢尾菊 D. 格桑花

50. 在公共场所进口和建筑物前的花坛起着 (A) 的作用

A. 装饰美化 B. 调节气候 C. 净化环境 D. 清新空气

51. 花坛的图案是根据花坛的类型和花坛的 (D) 来确定的

A. 大小 B. 形状 C. 用途 D. 植物材料

52. 花丛式花坛将多种植物种在一起, 必须注意选择不同 () 的品种; (B)

A. 植物 B. 花期 C. 花卉 D. 高矮

53. 花坛作为 (), 周围环境以绿色为主, 花坛的色彩可以丰富一些; (A)

A. 主景 B. 配景 C. 装饰 D. 衬托

54. 准确地讲, 林木个体的生命周期应该 () 起, 到植株死亡的全过程; (D)

A. 种子萌发

B. 苗木栽植

C. 郁闭成林

D. 母树受精卵第一次分裂

55. 截去幼树地上部分,使其重新萌生新的枝条,培养优良树干的抚育措施是(B);

A. 截干 B. 平茬 C. 修枝 D. 除蘖

56. 下列措施中,属于改善树木个体,适应生存环境的是(B);

A. 除草 B. 修枝 C. 施肥 D. 松土

57. 下列属于生产绿地的是(B);

A. 森林公园 B. 花圃 C. 植物园 D. 公园

58. 下列树丛组合相对稳定,在稳中变化,配置中广泛应用的是(D);

A. 常绿树组合 B. 落叶树组合

C. 针叶树组合 D. 常绿树、落叶树组合

59. 草木花卉的最低种植土厚度为(D)

A. 15cm B. 20 cm C. 25cm D. 30cm

60. 下面哪种植物是灌木(C);

A. 银杏 B. 樱花 C. 紫薇 D. 白玉兰

61. 树木的移植时间一般应在进行(C);

A. 生长高峰期 B. 生长期

C. 生长期之前 D. 避开生长高峰期

62. 在幼苗生长初期施肥,应多施(B);

A. 养分全面的肥料 B. 氮肥和磷肥 C. 磷肥和钾肥 D. 钾肥

63. 苗木夏季浇水应选择()进行效果最好;(D)

A. 早上 B. 中午 C. 下午 D. 傍晚

64. 以下不能做行道树的是(C)

A. 大王椰 B. 木棉 C. 三角梅 D. 秋枫

65. 氮肥供应过多,会导致植物(A);

A. 徒长 B. 停止生长 C. 提前开花 D. 开花多

66. 一般来讲,地下水位较低,通气良好、土壤肥沃、光照充足的地区,根系发达,分布(A);

A. 较深 B. 较浅 C. 较多 D. 较少

67. () 主要的生理功能是光合作用和蒸腾作用; (C)
 A. 根 B. 茎 C. 叶 D. 枝
68. 常绿树树叶的寿命的长短依植物种类 () 而有差异; (B)
 A. 相同 B. 不同 C. 类型 D. 多少
69. 土壤 () 是鉴别土壤肥力的重要标志; (B)
 A. 结构 B. 质地 C. 容重 D. 密度
70. 土壤中 () 的含量多少, 可说明土壤养分储备水平, 也是评价土壤肥瘦的重要标志之一; (A)
 A. 有机质 B. 腐殖质 C. 水分 D. 热量
71. 土壤有机质的来源中最多的是以下哪个死亡后的残留体 (A);
 A. 植物 B. 动物 C. 微生物 D. 以上三个答案都不对
72. 根据植物不同生长季节和生长速度的快慢, 补充增施的肥料称为 (B);
 A. 基肥 B. 追肥 C. 种肥 D. 根外追肥
73. 以下哪个是花卉植物生长发育的物质来源; (B)
 A. 温度 B. 光照 C. 水分 D. 空气
74. 花卉的一切生命活动必须在一定的 () 下才能正常进行; (A)
 A. 温度 B. 湿度 C. 水分 D. 空气
75. 浇花用水以哪种为宜; (C)
 A. 磁化水 B. 自来水 C. 软水 D. 硬水
76. 防寒越冬是指对 () 耐寒力差的, 采取各种防寒措施; (B)
 A. 花卉 B. 露地花卉 C. 温室花卉 D. 盆栽
77. 在冬季气温不太低、无冻害和早春无旱害的地区, 适宜进行 (C) 移植;
 A. 春季 B. 夏季 C. 秋季 D. 冬季
78. 移植时, 苗木要扶正以下 () 部位, 要舒展, 不能有窝根现象; (A)
 A. 根系 B. 枝叶 C. 茎部 D. 干部

79. 移植苗木时要保护好哪个部位,切勿损伤幼芽,擦伤枝条;(A)
A. 树冠 B. 树枝 C. 枝叶 D. 根系
80. 苗株最好是随起、随运、随栽;尽量()苗根暴露的时间;(C)
A. 延长 B. 增加 C. 缩短 D. 压缩
81. 苗木移植成活的哪个时期,在雨季来临之前的干旱季节,灌水量大,灌水次数要多(A);
A. 初期 B. 中期 C. 后期 D. 成熟期
82. 为保证苗木发育正常,防治枝条干枯,最好在三月中旬浇一次(A);
A. 春水 B. 透水 C. 大水 D. 冻水
83. 修剪是在()基础上根据某种目的而实施的;(A)
A. 整形 B. 剪枝 C. 回缩 D. 疏枝
84. 行道树和庭荫树苗木培育的关键是树干和(A)的培育;
A. 树冠 B. 树根 C. 树枝 D. 枝叶
85. 一般乔木可以保持树木自然冠形,只是一些()需要及时除掉(A)
A. 竞争枝 B. 果枝 C. 营养枝 D. 辅养枝
86. 花灌木第一次移植时,对地上部分进行重剪,只留多少个芽促其多生分枝;(C)
A. 1—3 个 B. 2—4 个 C. 3—5 个 D. 4—6 个
87. 花灌木通过重截疏枝后经过培育()即可形成灌丛;(B)
A. 半年 B. 一年 C. 二年 D. 三年
88. 藤木类整形修剪主要是培育哪个枝条根系和枝条健壮的;(D)
A. 根系 B. 枝条 C. 侧枝 D. 主枝
89. 在培育()时,对顶芽比较饱满的树种,移植后一般不剪梢;(C)
A. 树冠 B. 树形 C. 树干 D. 树势
90. 草坪草一般为(C)草种,寿命在三年以上;
A. 一年生 B. 二年生 C. 多年生 D. 寄生

91. 为了使园林绿化丰富多彩,除采用自然树形外,还可利用树木()特点;通过修剪,培育各种不同形状;(C)

A. 生长 B. 发枝 C. 发育 D. 萌发

92. 种草坪的土地,土壤厚度决不能少于;(A)

A. 30cm B. 40cm C. 50cm D. 60cm

93. 暖地型草种一般在()播种最适宜;(D)

A. 3—5月 B. 4—6月 C. 5—7月 D. 6—8月

94. 蝼蚁危害后,致使树木()部分枯黄死亡;(C)

A. 根 B. 地下 C. 地上 D. 叶

95. 由于根的生长状态受()影响,因而深根系与浅根系是相对的(C)

A. 土壤条件 B. 人为因素 C. 外界条件 D. 气象条件

96. 如果()与土温相差太大,易伤害花卉根系;(A)

A. 水温 B. 日温 C. 夜温 D. 气温

97. 冬季气温低,许多花卉进入休眠或半休眠期,要(B)浇水;

A. 连续 B. 控制 C. 常 D. 不断

98. 苗木修剪,主要是指苗木在苗圃(B)期间的修剪;

A. 生长 B. 育苗 C. 结果 D. 开花

99. 落叶树和常绿树是按乔、灌木是否(B)分类的

A. 生长 B. 落叶 C. 休眠 D. 发育

100. 西方园林,从古埃及、希腊、罗马起到 18 世纪英国风景式园林产生以前,基本以(A)为主

A. 规则式 B. 自然式 C. 混合式 D. 规律式

101. 在植物生长季节,根据植物生长情况,及时地喷洒在植物体上的肥料称为;(D)

A. 基肥 B. 追肥 C. 种肥 D. 根外追肥

102. 浇花用水以软水为宜,在软水中又以最为理想是(D)

A. 磁化水 B. 自来水 C. 矿泉水 D. 雨水雪水

103. 培养土配制一次后可使用 (), 因此需要贮藏以备及时应用;
(D)

A. 三年 B. 四年 C. 五年 D. 多年

104. 一般园林常用阔叶绿化树种, 在其播种或扦插 () 后即可进行第一次移植; (A)

A. 一年 B. 二年 C. 三年 D. 四年

105. 对分枝力 () 的灌木, 每次移植时应进行重截, 促其多发分枝;
(A)

A. 软弱 B. 较强 C. 较快 D. 较慢

106. 使用滚刀式剪草机修剪草坪时, 如发现叶片挤伤, 原因是; (C)

A. 前进速度太快 B. 前进速度太慢

C. 刀片钝 D. 修剪高度小

107. 使用滚刀式剪草机修剪草坪时, 草坪表面如出现波浪式起伏, 原因常常是; (B)

A. 片钝 B. 前进速度过快 C. 修剪高度大 D. 修剪高度小

108. 用撒播法播种时, 先在草子中掺 (B) 的细沙土, 再均匀播于沟内;

A. 1—2 倍 B. 2—3 倍 C. 3—4 倍 D. 4—5 倍

109. 用铺草块的方法栽植草坪的优点是; (D)

A. 一年四季均可施工 B. 成本低 C. 用水少 D. 成型快

110. 铺草块除 () 期间一年四季均可施工; (A)

A. 冻土 B. 解冻 C. 雨季 D. 夏季

111. 冷季型草播种发芽后 () 就可以开始修剪; (A)

A. 1 个月 B. 2 个月 C. 3 个月 D. 4 个月

112. 草坪是指由人工建植或人工养护管理, 起绿化、美化作用的; (D)

A. 花卉 B. 乔木 C. 灌木 D. 草地

113. 灌木通常指树体矮小, 多干丛生, 高度在 (A) 以下;

A. 3m B. 4m C. 5m D. 6m

114. 种在道路和公路两旁的树木称为; (A)

A. 行道树 B. 庭园树 C. 庭荫树 D. 绿篱树

115. 草坪修剪机用完后, 应采取的防护保养措施是; (C)
- A. 清除草屑后放入库房
B. 把刀片擦拭后, 上完油再放入库房
C. 清除机体上的尘土和草屑, 刀片擦拭、上油后再放入库房
D. 只要没有故障, 可直接放入库房
116. 下列藤本树种, 以吸盘进行攀援的是; (B)
- A. 凌霄 B. 爬山虎 C. 葡萄 D. 紫藤
117. 下列树种, 掌状复叶的是 (D)
- A. 八角金盘 B. 无患子 C. 合欢 D. 七叶树
118. 棕榈有不同于一般树种的特点是 (D) ;
- A. 枝条很长 B. 枝条簇生 C. 枝条轮生 D. 无枝条
119. 大叶黄杨属于 (C);
- A. 黄杨科 B. 冬青科 C. 卫矛科 D. 木犀科
120. 悬铃木对阳光的要求属于 (A)
- A. 阳性树 B. 中性树 C. 用性树 D. 半阴性树
121. 下列树种中, 是单叶树种 (C);
- A. 刺槐 B. 紫藤 C. 紫荆 D. 合欢
122. 夹竹桃是一种 (B) 的树;
- A. 无抗性 B. 抗性很强 C. 抗性一般 D. 对有害气体敏感
123. 千日红的观赏期较长, 其原因主要是 (B) 的缘故;
- A. 开花时间较长 B. 苞片膜质可作“干花”观赏
C. 分批播种 D. 生长旺盛
124. 羽衣甘蓝是一种的草花; (A)
- A. 耐寒、喜光、喜肥 B. 畏寒、喜阴、忌肥
C. 耐寒、喜阴、喜肥 D. 畏寒、喜光、忌肥
125. 从卵细胞受精形成合子开始, 至胚胎具有萌发能力并以种子形态存在的时期是 (A)
- A. 种子期 B. 幼年期 C. 青年期 D. 壮年期

126. 一品红最主要的观赏部位是 (B)

A. 花瓣 B. 苞片 C. 萼片 D. 雄蕊

127. 雌雄同株的树种是 (C)

A. 杨 B. 柳 C. 松 D. 银杏

128. 以下哪个 易被苗木吸收利用; (C)

A. 吸湿水 B. 膜状水 C. 毛管水 D. 力水

129. 适宜插根育苗的树种是; (B)

A. 杨树 B. 柳树 C. 桂花 D. 桉树

130. 贺州市的市花是 (C);

A. 三角梅 B. 紫薇 C. 莲花 D. 白兰花

131. 下列哪种不属于中国古代皇家园林 (D)。

A. 颐和园 B. 圆明园 C. 承德避暑山庄 D. 拙政园

132. 中国式建筑在宋代已达到成熟阶段, (C) 是我国古代最完整的建筑技术书籍, 书中总结了历代建筑成就, 制订了设计模数和工料定额制度, 为以后建筑业确定了楷模。

A. 园冶 B. 一家言 C. 营造法式 D. 营造则列

133. 城市新区建设绿地率不应低于 (B)

A. 25% B. 30% C. 35% D. 40%

134. (D) 是计算公园各种设施数量、规模以及公园管理的依据。

A. 公园红线面积 B. 公园平均游入量

C. 绿地率 D. 公园最大游入量

135. 公园设计必须确定公园的游人容量, 作为计算各种设施的容量、个数、用地面积以及进行公园管理的依据。公园游人容量应按公园总面积除以游人人均占有面积计算。最低游人人均占有公园的陆地面积不得低于 (B)。

A. 10 m² B. 15 m² C. 20 m² D. 25 m²

136. 居住区绿地由以下几部分组成, 即: 公共绿地、道路绿地、配套公建所属绿地与 (C)。

A. 阳台绿地 B. 屋顶花园 C. 宅旁绿地 D. 广场绿地

137. 建筑平面图除应标明建筑物的平面形状、房间布置以及墙、柱、门、窗、楼梯、台阶、花池等位置外,还应标注必要的(B)、标高及有关说明。

A. 方向 B. 尺寸 C. 朝向 D. 大小

138. 按照城市广场的平面形式,城市广场可以分为(B)。

A. 平面型和立体型 B. 单一形态和符合形态

C. 上升式和下沉式 D. 圆形和梯形

139. 假山施工图中,由于山石素材形态奇特,不可能将各部尺寸一一标出,一般采用(A)

A. 坐标方格网法 B. 断面图法

C. 高程标注法 D. 平面图法

140. 位于园林轴线及风景线端点的景物叫(A)

A. 对景 B. 借景 C. 框景 D. 障景

141. 无障碍设计规范中规定公共建筑室外外台阶踏步宽度不宜小于(C),踏步高度不宜大于 150mm,并不应小于 100mm。

A. 200mm B. 250mm C. 300mm D. 350mm

142. 苗木的胸径是指从树木根部算起多少米位置的树干直径(B)

A. 0.8m B. 1.2m C. 1.5m D. 1.8m

143. 根据《城市绿地设计规范》,下列说法错误的是:(D)

A. 儿童游乐区严禁配置有毒、有刺等易对儿童造成伤害的植物。

B. 城市开放绿地的出入口、主要道路、主要建筑等应进行无障碍设计,并与城市道路无障碍设施连接。

C. 城市绿地中涉及游人安全处必须设置相应警示标识。

D. 城市绿地范围内的古树名木必须原地保留。根据造景需要,可适当调整树木根颈处的地形标高。

144. 无护栏的园林水池中设置水中汀步时,其汀步两侧的水深不得大于多少米(A)

A. 0.5m B. 0.7m C. 0.8m D. 1.0m

145. 下列哪项不属于太湖石的特点 (C)
A. 瘦 B. 漏 C. 精 D. 透
146. 《园冶》是由 (C) 的计成所写
A. 宋朝 B. 元朝 C. 明朝 D. 清朝
147. 位于建筑北面光照不足的绿地宜选用以下哪几种植物 (D)。a、美人蕉 b、沿阶草 c、杜鹃 d、叶子花 e、合果芋 f、山茶
A. abcf B. cdef C. bcde D. bcef
148. 以下那组植物是挺水植物 (C): a、荷花 b、睡莲 c、芦苇 d、再力花 e、菹草 f、水葱
A. abdf B. acef C. acdf D. bcdf
149. 以下哪种植物是常绿观花乔木 (D)。
A. 桃花 B. 樱花 C. 凤凰木 D. 火焰木
150. 桂花是著名的香花树种, 除了其品种四季桂之外, 每年的开花期均在 (C) 间
A. 3~4 月 B. 8~9 月 C. 9~10 月 D. 11~12 月
151. 以下哪种植物不属于南宁乡土植物 (A)。
A. 银杏 B. 榕树 C. 扁桃 D. 朱槿
152. 儿童娱乐区严禁配置有毒、有刺等易对儿童造成伤害的植物。以下哪种植物不能种在儿童娱乐区 (A)。
A. 木棉 B. 银杏 C. 桂花 D. 香樟
153. 城市开放绿地内, 水体岸边 2m 范围内的水深不得大于 (B); 当达不到此要求时, 必须设置安全防护措施。
A. 0.5m B. 0.7m C. 0.9m D. 1.0m
154. 主要反映园林地形地貌及建筑、园路的坡度、高程情况的园林设计图是 (B)。
A. 地形设计图 B. 竖向设计图 C. 空间设计图 D. 坡度设计图
155. 国家园林城市系列, 包括国家园林城市及国家生态园林城市、国家园林县城和 (C)。

A. 国家生态园林县城 B. 生态园林城镇 C. 国家园林城镇 D. 生态公园城市

156. 城乡建设用地竖向规划应满足地面排水坡度的要求；地面自然排水坡度不宜小于（ C ）；。

A. 0.1% B. 0.2% C. 0.3% D. 0.5%

157. 公园园路主路和次路的纵坡宜小于（ ），同一纵坡坡长不宜大于（ ）。 （ D ）

A. 6% 150m B. 6% 200m C. 8% 150m D. 8% 200m

158. 以下哪项不属于岭南园林的造园特色（ A ）

A. 多以人工方法开池浚壑，理石挑山，在极为有限的空间内营造咫尺山林。

B. 园林选址尽可能离开闹市，建在真山真水的大自然中，以便于利用自然环境因素。

C. 园林的性格表现为开朗、明快、简洁，表达方式直接明了。

D. 多元兼容性，既有北方和江南园林的影子，也有极强的地域特征以及外来的建筑符号和造园手法。

159. 以下关于岭南园林的植物特色的描述，哪个是错误的（ C ）

A. 观赏植物品种繁多，绿荫葱翠。

B. 除亚热带的花木之外，还大量引进外来的植物。

C. 季相变化丰富，四季分明。

D. 榕树、蒲葵、荔枝、炮仗花等是岭南园林常见的植物。

160. 由设计单位在初步设计阶段，根据初步设计图纸，按照各类工程概算定额和有关的费用定额等资料编制的称为（ B ）

A. 投资估算 B. 设计概算 C. 工程预算 D. 施工概算

161. 屋顶绿化最好选用（ A ）土壤。

A. 人工配置的轻质 B. 不透水 C. 粘质 D. 砂质

162. 被誉为美国风景园林之父的是（ C ）。

A. 彼得·沃克 B. 丹·凯利 C. 奥姆斯特德 D. 安东尼奥·高迪

163. 不属于彼得·沃克作品的是 (D)。

- A. 美国 911 国家纪念公园 B. 伯奈特公园
C. 哈佛大学唐纳喷泉 D. 纽约中央公园

164. 中国首位获国际风景园林师联合会 (IFLA) 杰弗里·杰里科爵士金质奖殊荣的风景园林师是 (B)

- A. 刘滨谊 B. 孙筱祥 C. 孟兆祯 D. 俞孔坚

165. 不属于俞孔坚主要设计理念的是 (B)。

- A. 白话景观 B. 极简主义 C. 大脚革命 D. “反规划”理论

166. 以下关于中山岐山公园案例作品中主要表现特色描述不正确的是 (C)。

- A. 属于滨水公园 B. 工厂改造项目
C. 生态保护为主 D. 结合雨洪考虑

167. 下列案例中不属于景观改造利用项目的是 (C)。

- A. 美国纽约曼哈顿高线公园 B. 上海世博后滩公园
C. 北京奥林匹克森林公园 D. 北京 798 艺术区

168. 以下城市组合中都举办过世界园艺博览会的正确选择是 (A)。

- A. 西安、北京、昆明、唐山 B. 北京、昆明、青岛、上海
C. 北京、唐山、青岛、上海 D. 西安、广州、唐山、沈阳

169. 以下关于贝律铭作品苏州博物馆描述不正确的是 (B)。

A. 一座在古典园林元素基础上精心打造出的创意山水园 B. 采用苏州传统园林表现手法进行设计
C. 北墙与拙政园衔接 D. 设计中“以壁为纸，以石为绘”

170. 以下案例中没有主要表现“海绵城市”理念的项目是 (D)。

- A. 贵州六盘水明湖湿地公园 B. 天津桥园公园
C. 哈尔滨群力公园 D. 深圳市南澳月亮湾广场

171. 在某公园绿地中，停车场设置了 80 个停车位，则应设置不少于 (B) 个无障碍机动车停车位。

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

172. 在某公园绿地中, 无障碍游览支路和小路的纵坡应小于 (C)。

A. 3% B. 6% C. 8% D. 10%

173. 在某公园绿地中, 紧邻湖岸的无障碍游览园路应设置护栏, 高度不低于 (B)。

A. 800mm B. 900mm C. 1050mm D. 1200mm

174. 在庭院绿化设计中, 以下 (D) 元素可以增加庭院的活力?

A. 单一的材料 B. 平坦的地面 C. 大块的草坪 D. 多样的植物和花卉

175. 在某公园绿地中, 经常通行机动车的园路宽度应大于 4m, 转弯半径不得小于 (C)。

A. 8m B. 10m C. 12m D. 18m

176. 小汽车停车场的遮荫乔木枝下净空应大于 (B)。

A. 2.2m B. 2.5m C. 2.8m D. 4m

177. 某公园陆地面积为 60 公顷, 垃圾箱设置间隔距离宜在 (A) 之间。

A. 50~100m B. 100~150m C. 150~200m D. 200~250m

178. 在我国 (B) 年以上树龄的树木, 树种稀有、名贵或具有历史价值、纪念意义的树木认定为古树名木。

A. 80 年 B. 100 年 C. 150 年 D. 200 年

179. 绿地中的假山登山道的走向应自然, 且符合设计要求, 踏步铺设应平整、牢固, 除特殊位置外, 高度不得大于 (D), 宽度不得小于 30~35cm。

A. 10cm B. 15cm C. 20cm D. 25cm

180. 游步道一般采用 (D) 平面线形, 随地形、景物的变化而自然弯曲。

A. 直线 B. 折线 C. 曲线 D. 自由曲线

181. 花为白色的园林植物是 (B)。

A. 迎春 B. 广玉兰 C. 中国无忧花 D. 石榴

182. 下列植物不属于乔木的是 (D)。
- A. 扁桃 B. 桂花 C. 银杏 D. 使君子
183. 下列属于水生植物的是 (A)。
- A. 香蒲 B. 春羽 C. 三角梅 D. 月季
184. 下列植物不属于先花后叶的是 (C)。
- A. 樱花 B. 黄花风铃木 C. 羊蹄甲 D. 梅花
185. 仙人掌上的刺是 (B)。
- A. 茎刺 B. 叶刺 C. 根刺 D. 托叶刺
186. 下列不必于球根花卉的是 (C)。
- A. 百子莲 B. 郁金香 C. 蒲包花 D. 百合
187. 下列那种是“岁寒三友”所指的植物 (A)。
- A. 松 B. 海棠 C. 牡丹 D. 兰花
188. 桅子花香浓郁，其开花季节为 (B)。
- A. 春季 B. 夏季 C. 冬季 D. 秋季
189. 下列可作观果树种的是 (D)。
- A. 白兰 B. 常春藤 C. 木槿 D. 南天竹
190. 下列植物不以观叶为主的是 (B)。
- A. 彩叶草 B. 风铃草 C. 鸭跖草 D. 吊兰
191. 园林中，下列哪些植物适合应用在水岸边？ (A)
- A. 落羽杉 B. 马尾松 C. 石榴 D. 朴树
192. 一般庭院水景池的水深可设计为 (C) 左右。
- A. 0.6 米 B. 0.5 米 C. 0.7 米 D. 1.0 米
193. 园林树木栽植的方式有三种 (A)
- A. 假植、移植、定植 B. 假植、移植、行植
- C. 分植、移植、定植 D. 假植、丛植、行植
194. 蹲配与建筑出入口相结合的两种山石布置手法叫 (D)
- A. 叠石 B. 掇山 C. 踏道 D. 踏蹀。
195. 喷泉水池的水口至少有进水口、给水口、泄水口和 (D)。
- A. 出水口 B. 排水口 C. 止水阀 D. 溢水口。

196. 按面层材料分, 天然块石路面为 (A)。

A. 整体路面 B. 块料路面 C. 简易路面 D. 碎石路面

197. 土方工程施工包括 (D) 四部分内容。

A. 运、拉、填、压 B. 移、挖、填、压

C. 运、挖、埋、压 D. 运、挖、填、压

198. 湖石类型要具备的石形特征是瘦、漏、透、(A) 四点。

A. 皱 B. 奇 C. 秀 D. 形

199. 列举四种我国常见的山石材料: 湖石、青石、黄石、(D)。

A. 麻石 B. 花岗石 C. 黄木纹石 D. 石笋

200. 斜坡填土时斜坡应先 (C), 再行填土。

A. 修整坡度 B. 碎石垫层 C. 挖成台阶状 D. 砌筑石块

二、多选题

1. 从园林规模和基本造园风格上区分, 中国古代园林类别可被分为 (C.D);

A. 江南园林 B. 民居园林 C. 私家庭园 D. 皇家园林

2. 中国传统园林艺术在处理园林与环境关系方面的重要艺术特点是: (B.C.E.);

A. 依山随势 B. 因地制宜 C. 巧于因借 D. 生动灵活 E. 相地合宜

3. 假山工程的主要内容大致上包括 (B.C.D.) 等几个方面;

A. 叠石 B. 塑山 C. 置石 D. 掇山 E. 做坡

4. 以下花卉不属于球根花卉的是 (CD)

A. 仙客来 B. 郁金香 C. 蒲包花 D. 芍药

5. 以下哪个是旱柳的习性中表现得很突出的优点; (ABCDE)

A. 耐寒 B. 耐旱 C. 耐积水 D. 耐荫蔽 E. 抗风

6. 常绿阔叶树中有较多的香花树种, 以下属于这类的是 (B.C.E.)

A. 香樟 B. 深山含笑 C. 白兰花 D. 桉树 E. 桂花

7. 以下哪些土类属于铁铝土; (ABD)

A. 砖红壤 B. 红壤 C. 棕壤 D. 黄壤

8. 以下哪些因素影响土壤的形成? (ABCD)
A. 时间 B. 生物 C. 气候 D. 母质
9. 下列属于乔木的植物有 (ACD)
A. 大王椰 B. 凌霄 C. 白兰 D. 芒果
10. 下列属于灌木的植物有 (ABC)
A. 黄素梅 B. 紫薇 C. 灰莉 D. 小叶榄仁
11. 修剪一级草坪需要选择下列哪些工具 (ABC)
A. 旋刀式剪草机 B. 安全工作警示牌 C. 防护眼镜 D. 捞网
12. 施药时要做好个人和他人的安全防护措施, 施药前务必放置指示牌划定工作区域, 操作人员要戴口罩 () 等, 并站在上风处操作, 注意保护作业人员和周边人员的安全; (ABC)
A. 戴胶手套 B. 戴眼镜 C. 戴防护帽 D. 戴手表
13. 修剪绿篱需要的工具有 ()、警示牌等; (BCD)
A. 剪草机 B. 绿篱机 C. 绿篱剪 D. 安全头盔
14. 以下属于时花的植物有 (BCD)
A. 散尾葵 B. 一串红 C. 一品红 D. 菊花
15. 园林树木是 (ABCD) 医院、学校及居住区等主要绿化题材之一, 不论在整个园林绿地系统或在各类型园林绿地中, 它都起着骨干作用;
A. 城市 B. 风景区 C. 疗养胜地 D. 厂矿
16. 下列植物中属于观花类的是 (AD)
A. 文心兰 B. 绿萝 C. 紫竹梅 D. 百合
17. 导致大树移植成活率低的因素主要包括 (BCD) 等;
A. 土球所带吸收根多
B. 木栓化严重, 根系吸收能力下降
C. 蒸腾面积大, 地上地下水分不平衡
D. 造成树皮受损、土球破裂、树枝折断
18. 下列昆虫中属于蛀干害虫的是 (AB);
A. 星天牛 B. 咖啡木蠹蛾 C. 梨网蝽 D. 黄刺蛾

19. 对于园林植物蛀干害虫的特点叙述正确的是 (BCD);
- A. 一般该类害虫的成虫和幼虫生活都较隐蔽;
B. 危害时害虫的虫口较稳定, 受环境条件影响较小;
C. 常蛀食园林植物枝干的韧皮部、木质部等, 危害严重;
D. 主要包括天牛、小蠹、木蠹蛾、茎蜂等类群;
20. 以下哪种为咀嚼式害虫 (ACD)
- A. 天牛 B. 蚧壳虫 C. 叶蜂 D. 刺蛾
21. 昆虫不完全变态要经历以下那个阶段 (ABC)
- A. 卵 B. 幼虫 C. 成虫 D. 蛹
22. 昆虫的口器有很多, 与园林植物关系密切的有 (ABCD)
- A. 咀嚼式 B. 虹吸式 C. 刺吸式 D. 挫吸式
23. 属于二年生的有 (ABD)
- A. 紫罗兰 B. 风铃草 C. 瓜叶菊 D. 三色堇
24. 常见整形修剪形式有 (BCD)
- A. 规则式 B. 自然式 C. 整形式 D. 混合式
25. 光合作用的直接产物有 (ABCD)
- A. 葡萄糖果糖 B. 蔗糖 C. 淀粉 D. 蛋白质
26. 诱杀法利用的是害虫的 (BC)
- A. 假死性 B. 趋化性 C. 趋光性 D. 群集性
27. 植物多样性原理在原理植物中应体现在 (ABC) 等方面
- A. 园林植物群落应有一定的物种组织, 避免单一
B. 园林植物群应有一定的层次结构
C. 园林植物群应有一定的年龄结构
D. 提倡大量使用大树、古树, 以更好地发挥生态性
28. 下列激素中, 促进生长发育的物质是 (ABC)
- A. 生长素类 B. 细胞分裂素 C. 赤霉素类 D. 乙烯
29. 园林工作班前准备内容包括__等的准备; (ABCDE)
- A. 人员 B. 机器及附件 C. 工具及易损件的配件

D. 观察作业地环境及检查作业地条件 E. 机油燃料

30. 在花卉的促成和抑制栽培中, 温度的主要作用是 (ABCD)

A. 打破休眠 B. 春化作用

C. 影响花芽的分化 D. 影响花茎的形成

三、判断题

1. 土壤中所有有机质和无机质物质的总和称为土壤矿物质 (×)

2. 有机质发生矿质化和腐殖化的转化过程都需要土壤微生物 (✓)

3. 种子萌发时首先是胚轴伸长, 将胚芽甚至子叶带出地面, 然后, 胚根突破种皮 深入土中形成主根; (×)

4. 果实成熟时呈现出红、蓝、黄、紫等颜色, 是因为液泡内积累较多花色素, 同时液泡的 pH 不同的原因导致 (✓)

5. 水平吊装和垂直吊装相比, 更能保护树皮 (×)

6. 吊装部位顶护板是为了保护树皮, 定植后不需要拆除 (×)

7. 树木输液能及时补充水份失衡, 可以常年使用; (×)

8. 嫁接愈合后绑扎物必须去除 (✓)

9. 落叶休眠树种多在秋季嫁接 (×)

10. 木本植物多在休眠期嫁接 (✓)

11. 绿篱机使用过程中没有燃料了, 一定要先将发动机停下来, 确认周围没有烟火后再加油; (✓)

12. 耐修剪是行道树和独赏树树种的选择条件之一 (×)

13. 植物缺乏氮、磷、钾、镁等元素, 缺素症状在下部老叶上最先表现出来 (✓)

14. 绿篱的修剪时期及次数要根据不同的树种灵活掌握。(✓)

15. 如果一种农药对某一种病虫害防治效果很好, 我们应该按照对症下药的原则坚持长期单一使用这种农药, 以达到控制这种病虫害的目的; (×)

16. 用复合肥进行追肥, 必须充分溶解于水; (✓)

17. 园林美是自然美、生活美、艺术美高度统一; (✓)

18. 当年枝条上形成花芽并开花的灌木，如木槿、八仙花等，应于花前重剪，利于促发壮枝和花芽分化；(×)

19. 整形绿篱修剪时，要顶面与侧面兼顾，从篱体横面看，以基小上大的倒梯形为好；(×)

20. 合理的修剪顺序，对高大乔木由下向上修剪，灌丛型花灌木由丛心向冠外修剪；(×)

21. 防止砸伤行人相过往车辆；公园及路树修剪，要有专人维护现场，树上树下互相配合，(✓)

22. 进入秋季后，为促进树木生长还应多灌水；对于枝叶修剪量少的移植大树，在高温季节除了保持土壤湿润；(×)

23. 为了节约用水，可以用工业污水浇灌树木；(×)

24. 一般叶片较大而且较薄比叶片较小而且较厚的植物更耐旱；(×)

25. 叶面追肥时需选择易溶于水的速效化肥，且保持湿润时间 30 分钟以上；(✓)

26. 可以依据“出新芽”来判断大树是否成活；(×)

27. 生长高度可达 5 米以上的木本植物是乔木；(×)

28. 鸡冠花栽培过程中不能摘心，因为摘心会影响其开花质量；(✓)

29. 石榴的果期是 10-11 月；(×)

30. 背负式手动喷雾器，加压后不喷水的原因可能是喷头孔堵；(✓)

31. 花灌木可在花后剪除残花，在夏季进行适当摘心，抑制其生长。(✓)

32. 植物嫁接成活的最重要技术要点是形成层对齐；(✓)

33. 在夏天中午给花草树木浇水的可能会造成树木的灼伤；(✓)

34. 夏季修剪主要内容和目的是调整主枝方位，疏删过密枝条，摘心，剪除孽芽等；(✓)

35. 所有植物病害均会出现病征；(×)

36. 中国古典园林按照园林基址的选择和开发方式的不同，可分为人工山水园和自然山水园两大类型。(✓)

37. 为了扩大观景空间,将园外景物有意识地组织起来进行欣赏,这种处理手法称为借景。(√)

38. 园林美的内容是生活美、自然美、艺术美的高度和谐统一,是自然景观与人文景观的高度统一。(√)

39. 游人在观赏风景过程中,因视点位置不同,而有平视、仰视、卧视三种观赏方式。(×)

40. 公园城市建设试点要从“生态文明建设”、“以人民为中心”的角度出发。(√)

41. 早熟禾是暖季型草坪草。(×)

42. 绿萝属于藤本植物。(√)

43. 地形图上相邻两条等高线垂直高度的差值叫等高距,水平距离叫平距。(√)

44. 镶隅与建筑拐角相结合的两种山石布置手法叫抱角。(√)

45. 大平剪手工修剪绿篱,需要紧贴篱面不漏剪。(√)

46. 园林设计是一门综合性的学科,涉及到自然科学、社会科学、人文科学和艺术等多个领域。(√)

47. 树木栽植成活的原理是保持和恢复树体以养分代谢为主的平衡。(×)

48. 疏剪指的是将枝条自分生处(枝条基部)剪去。(√)

49. 寒害是指 0℃以上的低温对树木所造成的危害。(√)

50. 花色艳丽的夹竹桃、黄蝉、络石等树种适宜种植在中小学校园。(×)

四、填空题

1. 园林给水水源可分为(地表水)和(地下水)。

2. 中国的五岳是指(泰山)(华山)(衡山)(嵩山)(恒山)五座山。

3. 造园的三大要素是(山水)(植物)(建筑)。

4. 太湖石表现于外的形体之美为瘦、透、漏、皱、丑。

5. 对于大多数花灌木来说，早春是修剪的最佳时期。
6. 完全叶是具有叶片、叶柄和托叶三部份的叶。
7. 被人称为“四君子”的是梅、兰、竹、菊。
8. 花灌木幼树生长旺盛，以整形修剪为主，休眠期修剪宜轻。
9. 园林排水方式有地面排水、沟渠排水和管道排水。
10. 在园林设计中，主题设计是指设计的中心思想和要表达的核心概念，可以通过植物、材料、颜色等元素来展现。
11. 在园林设计中，比例是指不同元素的尺寸关系，可以影响设计的比例和平衡。
12. 花芽分化的类型有夏秋分化型、冬春分化型、当年分化型、多次分化型。
13. 园林树木适地适树的途径有选树适地、选地适树、改树适地、改地适树。
14. 园林树木生长地的排水方法主要有明沟排水、暗道排水、地面排水。
15. 对称地种植大致相等数量的树木称为对植。
16. 常用来进行暖季型草坪交播的草坪草种是多年生黑麦草和粗径早熟禾。
17. 依据作用范围，除草剂可分为选择性除草剂和非选择性除草剂。在草坪草播种前，通常选用非选择性除草剂进行杂草的防除。
18. 冷季型草坪草最适宜生长温度是 15—25℃，在我国，主要分布在华北、东北、西北等地区。一年中有两个生长高峰期。
19. 对于大多数阔叶树中绿篱，一般不选择在冬季进行修剪。
20. 绿篱的修剪时期，一般在冬季到来之前完成。